

Blut- und Lymphsystem

Gradation						
GNr:	I	II	III	IV	V	VI
9		<p>Anamnestisch häufige reaktive Lymphknotenschwellungen aus erkennbar gutartigen Gründen.</p> <p>Operative Lymphknotenausräumung bei gutartiger Grunderkrankung.</p>	<p>Nachgewiesene Hämolyse ohne Anämie, ohne Krisen und ohne deutliche Milzvergrößerung.</p> <p>Leukozytose ohne Krankheitswert.</p> <p>Auch längerbestehende geringfügige, gutartige Lymphknotenschwellungen oder Milzvergrößerung ohne Krankheitswert.</p>	<p>Nachgewiesene Hämolyse mit nur geringfügiger Anämie, ohne Krisen und ohne deutliche Milzvergrößerung.</p> <p>Perniziöse Anämie mit guter therapeutischer Ansprechbarkeit.</p> <p>Thalassämia minor.</p> <p>Leukopenie ohne Krankheitswert.</p>	<p>Behandelbare Anämie (z.B. Blutung, Eisenmangel, Infektanämie).</p> <p>Rückbildungsfähige, reaktive Blutzellenvermehrung.</p> <p>Rückbildungsfähige, nicht neoplastische, akute Lymphknotenschwellung.</p>	<p>Therapieresistente Anämie, Leukopenie oder Thrombopenie.</p> <p>Nachgewiesene Hämolyse mit Anämie oder Krise oder deutlicher Milzvergrößerung.</p> <p>Neoplasien des blutbildenden oder lymphatischen Systems.</p> <p>Klinisch relevante Gerinnungsstörungen.</p> <p>Manifestation des v. Willebrand-Jürgens-Syndroms und anderer Hämophilien.</p> <p>Mangel an Inhibitoren des Gerinnungssystems mit Thrombosegefährdung (u.a. APC-Resistenz).</p>

Anmerkung:

Bei unzureichender Möglichkeit der Beurteilung fachärztliche Untersuchung/Befundbericht erforderlich.