

Brustkorb

Gradation						
GNr:	I	II	III	IV	V	VI
43		Formveränderungen des Brustkorbes (z.B. Trichterbrust), die im bekleideten Zustand nicht auffallen und das Tragen militärischer Ausrüstung nicht behindern.	Korrigierte Formveränderung des Brustkorbes mit geringer Funktionseinschränkung der Lunge und des Herzens, frühestens 1 Jahr nach Operation.	<p>Stärkere Formveränderungen des Brustkorbes mit geringer Funktionseinschränkung der Lunge und des Herzens, die das Tragen der persönlichen Ausrüstung und den Einsatz in bestimmten militärischen Verwendungen noch erlauben.</p> <p>Korrigierte Formveränderung des Brustkorbes mit mäßiger Funktionseinschränkung der Lunge und des Herzens, frühestens 1 Jahr nach Operation.</p>	<p>Akute Erkrankungen und Verletzungen des Brustkorbes.</p> <p>Korrigierte Formveränderungen des Brustkorbes bis zu 1 Jahr nach Operation.</p>	Durch Anlage, Krankheit oder Trauma bedingte Formveränderungen des Brustkorbes mit nachgewiesener erheblicher Funktionseinschränkung der Lunge und des Herzens.

Anmerkung:

In Zweifelsfällen ab Gradation IV orthopädisch/chirurgische bzw. internistische Untersuchung oder Befundbericht erforderlich.