

Schilddrüse

Gradation						
GNr:	I	II	III	IV	V	VI
38		<p>Euthyreote Struma diffusa oder nodosa ohne Verdrängung der Luftröhre.</p> <p>Schilddrüsenzysten oder Schilddrüsenpseudozysten ohne Verdrängungserscheinungen.</p> <p>Hypothyreose mit euthyreoter Stoffwechsellage unter Substitutionstherapie (auch als bleibender Zustand nach Autoimmunthyreopathie oder Radiojodtherapie).</p>	<p>Unifokale oder multifokale thyreoidale Autonomie bei peripher euthyreoter Stoffwechsellage.</p>	<p>Zustand nach Behandlung eines M. Basedow, einer endokrinen Ophthalmopathie oder einer anderen Autoimmunthyreopathie; rezidivfreies Intervall größer als zwei Jahre.</p>	<p>Schilddrüsenveränderungen, die einer Operation und/oder Radiojodtherapie bedürfen; M. Basedow, endokrine Ophthalmopathie oder andere Autoimmunthyreopathie bis zu einem rezidivfreien Intervall von 2 Jahren.</p> <p>Hyper- oder hypothyreote Stoffwechselzustände bis zur Ursachenabklärung.</p>	<p>Mehr als ein Rezidiv einer Autoimmunthyreopathie.</p> <p>Z.n. endokriner Ophthalmopathie mit bleibenden Folgeschäden.</p> <p>Große euthyreote Struma mit Verdrängungserscheinung der Halsorgane.</p> <p>Maligne Schilddrüsenerkrankungen.</p> <p>Primäre und sekundäre therapieresistente Hypothyreose jeglicher Genese.</p>

Anmerkungen:

- Internistisch/nuklearmedizinischer Befundbericht erforderlich.
- Ab Gradation IV bei Ophthalmopathien augenärztlicher Befundbericht erforderlich